



**Calbio** è un mangime complementare minerale dietetico per riduzione del rischio di febbre lattea in bolo, caratterizzato da elevato contenuto di calcio in forme altamente biodisponibili e vitamina D<sub>3</sub>. Se l'incidenza di ipocalcemia clinica e conseguente collasso puerperale risulta limitata e facilmente riscontrabile, numerosi autori riportano un'incidenza di ipocalcemia subclinica in vacche da latte superiore al 50% (Goff, 2007; Santos et al., 2016). Tale patologia nutrizionale determina scarsa assunzione di alimento, immunodepressione e predispone all'insorgenza di svariate patologie tipiche del periparto (ritenzione di placenta, metriti, mastiti, chetosi, dislocazione dell'abomaso etc.). La concentrazione ematica di calcio si riduce in maniera significativa a partire da 2 giorni prima del parto a seguito della produzione di colostro, facendo registrare il picco minimo tra le 12 e le 24 ore post parto (Oetzel, 2012). In abbinamento ad un corretto bilancio cationi/anioni della dieta delle ultime 3/4 settimane pre-parto, **Calbio** rappresenta un utile supporto allo scopo di limitare il rischio di febbre lattea, in quanto apporta una significativa quantità di calcio da forme ad elevata biodisponibilità, quali formiato di calcio e litotamnio. **2 boli Calbio apportano circa 70 gr di calcio.** L'apporto di vitamina D<sub>3</sub> promuove l'assorbimento attivo del calcio a livello intestinale nel lungo periodo.

Grazie alla sua composizione non interferisce con i normali processi di caseificazione del latte.

#### Caratteristiche tecniche:

##### ADDITIVI PER KG:

##### Conservanti

1a238 Calcio formiato \_\_\_\_\_ 550.000 mg

##### Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo

3a671 Vitamina D<sub>3</sub> \_\_\_\_\_ 175.000 UI

##### COMPONENTI ANALITICI % s.t.q.:

Calcio \_\_\_\_\_ 19,0 %

Fosforo \_\_\_\_\_ 0,0 %

Magnesio \_\_\_\_\_ 0,4 %

Potassio \_\_\_\_\_ 0,0 %

Cloruri \_\_\_\_\_ 0,0 %

Sodio \_\_\_\_\_ 0,0 %

Zolfo \_\_\_\_\_ 0,0 %

#### COMPOSIZIONE:

Sorbitolo, Grasso purificato e idrogenato da olio di palma (come supporto e protezione di additivi), Litotamnio, Magnesio stearato, Saccarosio.

Apporto di calcio: calcio formiato (Ca 30%), litotamnio (Ca 30%).

#### Come si usa:

Somministrare **Calbio** dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto. Si consiglia la somministrazione di 2 boli contemporaneamente al momento del parto, seguita da un'ulteriore somministrazione di due boli contemporaneamente a 12 o 24 ore dal parto, in caso di necessità.

Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso.

#### CONFEZIONE



SCATOLA DA 20 BOLI

SEDE LEGALE:  
Via Moretti, 34  
24121 Bergamo (BG)  
Tel. +39 035.0667172

info@martensitalia.com  
www.martensitalia.com

Agg. SCHEMA TECNICA  
31/07/2024

Le presenti informazioni, accurate e complete, sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, quanto specificato, non può essere considerato come un diritto o garanzia.