

MALTODESTRINE - FS

Maltodestrina 13.3.6



Note tecniche:

Le MALTODESTRINE – FS derivano dall'amido di mais che ha subito un trattamento enzimatico e termico. L'amido viene quindi scisso in zuccheri, da cui si ottiene il maltosio e le destrine, zuccheri a pronto effetto e facilmente assimilabili.

L'utilizzo di MALTODESTRINE –FS nelle razioni alimentari delle bovine da latte ottimizza l'attività dei batteri ruminali preposti alla digestione degli animali (Fibra), migliorando la resa energetica della dieta e fornendo all'animale più acido acetico (precursore del grasso nel latte) e più proteina microbica ad alto valore amminoacidico (indispensabile per la sintesi di caseina a livello mammario).

Aspetto:

Polvere
Bianco

Caratteristiche tecniche:

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):

Destrosio Equivalenza _____ 20

PH (in soluzione) _____ 4.5 – 5.5

Come si usa:

Miscelare negli alimenti componenti la dieta giornaliera secondo le istruzioni del tecnico nutrizionista.

Vacche da latte _____ 300 – 700 gr capo/giorno

SEDE LEGALE:

Via Moretti, 34
24121 Bergamo (BG)
Tel. +39 035.0667172

info@martensitalia.com
www.martensitalia.com

Agg. SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE



SACCO 25 KG

Le presenti informazioni, accurate e complete, sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, quanto specificato, non può essere considerato come un diritto o garanzia.