

SPECIALTOP BROMA PASTA PRO



COSA È:

Esca rodenticida ad uso professionale pronta all'uso in pasta fresca .

CODICE PRODOTTO:

30300106

COMPOSIZIONE :

100 gr di prodotto contengono:
Bromadiolone 0,005 gr;
Denatonio benzoato 0,001 gr,
Calcio idrossido 0,375 gr,
Coformulanti e appetizzanti qb a
100 gr.

INDICATO PER:

Topolino domestico, ratto grigio,
ratto nero

COME SI USA:

QUANTITÀ PER CONTENITORE DI ESCHE	
Topolino domestico	40 gr (2 esche da 20 gr)
Ratto nero	60 – 100 gr (3 – 5 esche da 20 gr)
Ratto grigio	

CONFEZIONE:

Secchio 5 kg



QUANDO SI USA

Specialtop broma pasta pro è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca pre- porzionata, appetibile per le specie di roditori bersaglio. Il prodotto per la sua modalità di azione non allerta e insospettisce gli altri componenti della popolazione di roditori. È efficace anche dopo una sola ingestione. Specialtop broma pasta pro contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Specialtop broma pasta pro per uso professionale può essere usato all'interno ed intorno edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

ISTRUZIONI PER L'USO: Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato e adeguatamente identificato, protetta dagli agenti atmosferici e da allagamenti, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i loro percorsi e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro. Questi vanno poi ispezionati nella prima settimana di trattamento ogni 2 – 3 gg per il topolino domestico e ogni 5 – 7 gg per il ratto. Successivamente è necessaria un'ispezione settimanale riempiendo i contenitori o sostituendo le esche quando necessario.