



MANGIME COMPLEMENTARE PER  
VITELLI, ANNUTOLI, AGNELLI E CAPRETTI



Il prodotto è stato formulato appunto per consentire l'immunizzazione dei vitelli nascituri quando il colostro materno non è disponibile oppure non è di adeguata qualità. La modalità di somministrazione è la stessa del colostro tradizionale solo che vuole preventivamente disciolto in acqua o nel colostro materno quando utilizzato come supplemento. Secondo modi, dosaggi e temperature indicati. La presenza di una integrazione vitaminica col gruppo A,D,E è stata formulata appunto per potenziare l'azione immunizzante del prodotto e colmare eventuali carenze nutrizionali. Somministrato alle concentrazioni indicate riesce a fornire su un pasto medio di 4,5 litri oltre 150 gr di IgG valore ideale per consentire il trasferimento dell'immunità passiva al nascituro.

Il Prodotto è esente da Brucellosi, TB, EBL(Leucosi), Johnes Disease, BHV-1, BVD e BSE.

#### Quando si usa:

In presenza di un colostro di scarsa qualità (< 50 gr IgG/L) oppure < 22° brix

Scarsità o assenza di colostro al momento dei parto.

Elevata presenza di carica batterica e coliformi fecali nel colostro fresco e/o congelato >100.000 UFC/ml e >10.000 UFC/ml per i coliformi.

Quando non è presente una banca del colostro in azienda.

#### Caratteristiche tecniche:

##### ADDITIVI PER KG:

##### Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo

Vitamina A 3a672a	25.000 U.I.
Vitamina D3 – Colecalciferolo 3a671	20.000 U.I.
Vitamina E 3a700	5.000 mg

##### COMPONENTI ANALITICI % s.t.q.:

Proteina grezza	47,9 %
Grassi grezzi	0,5 %
Fibra Grezza	0,9 %
Sodio	0,1 %
Ceneri grezze	4,0 %

##### COMPOSIZIONE:

Colostro in polvere, Destrosio anidro, Prodotti del lievito, Saccarosio.

Contenuto minimo IgG 150.000 mg/Kg

#### COME SI USA:

*Vitelli e vitelli bufalini:* Come sostitutivo del colostro materno o in ragione di 200 - 250 g per litro di acqua calda (40°C), oppure in qualità di complemento del colostro ad un quantitativo pari a 1-2 misurini (20 - 40 gr) per litro di colostro materno. Entro 2 - massimo 6 ore dalla nascita.

*Agnelli e capretti:* come sostitutivo del colostro materno, ad un quantitativo pari a 20 - 25 grammi ogni 100 - 200 ml di acqua calda (40°C), oppure in qualità di complemento ad un quantitativo di 2 - 4 gr per 100 - 200 ml di colostro materno. Entro 2 - massimo 6 ore dalla nascita dalla nascita.

Nella confezione è presente in misurino che equivale a circa 20 gr di prodotto.

#### CONFEZIONE



BUSTA DA 800 GR

SEDE LEGALE:  
Via Moretti, 34  
24121 Bergamo (BG)  
Tel. +39 035.0667172

info@martensitalia.com  
www.martensitalia.com

Agg. SCHEMA TECNICA  
10/02/2025

Le presenti informazioni, accurate e complete, sono basate sulle conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, quanto specificato, non può essere considerato come un diritto o garanzia.